

流行性感疫苗

Influenza Vaccine

一、什麼是流行性感疫苗？

(一) 疫苗性質：不活性疫苗，用於預防流行性感，但只能預防當季流行之A型及B型流行性感，不能預防一般的感冒，接種後抗體約在10天後產生，免疫力可持續1年。

(二) 接種方法：肌肉深部注射。

(三) 接種劑量：3歲以下每次0.25cc；3歲以上每次0.5cc。

二、何時接種？

(一) 出生滿6個月以上接種。

(二) 8歲以前未接種過需注射2次，隔4週後再接種第2劑。

(三) 必須每年接種。

三、下列狀況不宜接種：

(一) 6個月以下嬰兒。

(二) 對雞蛋過敏者。

(三) 發燒或急性疾病者。

四、接種後注意事項：

(一) 接種部位可能有紅腫、疼痛、瘀斑或硬塊等局部反應。

(二) 全身反應如發燒、倦怠、肌肉酸痛、頭痛、眩暈、發抖、出汗、關節痛等極少發生，通常1-2天消失。

(三) 注意體溫變化，請多喝開水、多休息，如有特殊反應請至醫院診治。

參考資料

程子芸、伍雁鈴(2014)·兒童傳染病及其護理·於陳月枝總校閱，實用兒科護理(七版，286-287頁)·台北：華杏。

羅巧薇(2015)·季節性流感及四價流感疫苗·兒科最前線，5(15)，62-65。

衛生福利部國民健康署(2015)·兒童健康手冊·臺中市：衛生福利部國民健康署。

所提供之資訊不能取代醫師之治療及醫師與病人之關係

(資料來源取自臺北榮民總醫院健康 e 點通)

臺北榮總蘇澳分院關心您

門診諮詢電話:03-9905106 轉 6150 或 6160

流行性感冒疫苗之個別護理指導單張

病歷號:_____

姓名:_____

於下述就醫日期至臺北榮總蘇澳分院(門診、住院、急診室)經醫師或護理人員說明解釋以瞭解。

衛教日期	家屬及病患簽名	指導者簽名